



Dr. Jeannette Peña Hall, D.M.D., P.A.
Practice Limited to Endodontics

INSTRUCCIONES DEL PACIENTE POST-TRATAMIENTO DE CONDUCTO

QUE PUEDE ESPERAR:

- 1.) No es fuera de lo normal experimentar un poco de molestia o hasta un dolor persistente inmediatamente después del tratamiento de conducto. Esto debe ir mejorando en aproximadamente una semana.
- 2.) Su diente puede estar sensible al ejercer presión en la mordida, y puede dar la sensación de estar flojo. Esta sensación es resultado de la sensibilidad del tejido justo afuera de el final de la raíz; esta sensación será por corto tiempo.
- 3.) Usted podrá sentir una depresión/hundidura o un área desnivelada en el área donde fue creado el acceso. Habrá un material suave temporal en esa área, lo cual puede desgastarse a cierto grado antes de su próxima cita.
- 4.) Ocasionalmente una pequeña burbuja o espinilla aparecerá en el tejido de la encía pocos días después de finalizado el tratamiento de conducto. Esto representa la liberación de presión y bacteria, la cual no puede sobrevivir alrededor del diente. Esto debe desaparecer dentro de pocos días.

QUE HACER:

- 1.) La Dra recomienda que tome un calmante para el dolor dentro de una hora al salir de la oficina, en orden de que el medicamento ya se encuentre en su sistema sanguíneo antes de que el efecto de la anestesia comience a pasar. Generalmente Ibuprofen (Advil o Motrin 600mg= 3 x200mg tabletas sin receta cada 6 horas) es el medicamento recomendado. **Si usted tiene una condición médica, alergia a la aspirina, o problemas de desorden intestinal, lo cual le prohíbe el uso de Ibuprofen; Entonces acetaminophen (Tylenol o Excedrin) son los calmantes recomendados.** Aspirina **No** es aconsejable, ya que tiende a incrementar el sangrado en el área tratada.
- 2.) En lo posible trate de masticar con el lado opuesto al diente tratado hasta que el diente haya sido protegido por una corona, ya que su diente estará propenso a fracturarse.
- 3.) Por favor, evite masticar chicle, caramelos o cualquier tipo de comida pegajosa, lo cual puede provocar el desplazamiento de el empaste temporal.

LLAMENOS SI.....

- 1.) Los síntomas se tornan más intensos, o de más tiempo de lo explicado anteriormente.
- 2.) Usted experimenta inflamación.
- 3.) El empaste temporal se ha desplazado, lo siente suelto o alto.
- 4.) Su diente se fractura.
- 5.) Usted tiene alguna pregunta o preocupación.