



Date:

Time:

Place:

Procedure

This procedure is being performed to evaluate your colon (large intestine). With a colonoscope (a long flexible tube) Dr. Llanaeza will be able to look at the lining of your colon through the colonoscope for abnormalities such as: polyps, tumor, inflammation, diverticulosis, and abnormal blood vessels. If necessary, biopsies can be taken for analysis, polyps can be removed, and areas of bleeding can be treated. After Dr. Llanaeza explains the procedure and answers your questions, you will be asked to sign a consent form.

Results & Clarifications

Please call our office (305.598.9090) 5 business days after your procedure for your results.

Dr. Llanaeza's service costs are separate from the facility's costs.

Supplies

1. GoLYTELY
2. Juices (not the color red)
3. Gelatin (not the color red)
4. Coffee
5. Tea
6. Broth
7. Soft Drinks

NO MILK PRODUCTS OR SOLIDS

Risks

Complications of a colonoscopy are rare. The risks as explained by Dr. Llanaeza include: reactions to medications, bleeding, and perforation. Be sure to inform Dr. Llanaeza if you have severe pain, black or bloody stools after your colonoscopy.

A colonoscopy prep causes the body to lose a significant amount of fluid and can result in sickness due to dehydration. It is important that you drink sufficient clear liquids before and during the prep. Replenish your body by drinking clear liquids after returning home from your colonoscopy.

3 Days Before Procedure:

1. Unless otherwise directed do NOT take: Aspirin, Advil, Nuprin, Motrin, Excedrin, Plavix, Persantine, Ticlid, Aggrenox, Pletal, Coumadin, Vitamin E, Herbal Medications (such as Echinacea, Ginko Biloba, etc.). TYLENOL is safe.
2. Do not eat any foods with seeds, beans, or nuts.

1 Day Before Procedure:

1. Follow a clear liquid diet the ENTIRE day before. NOTHING SOLID, COLOR RED OR MILK PRODUCTS. If you are a diabetic, drink regular (non-diet) liquids in moderation throughout the day.
2. Add lukewarm drinking water to the top line of the container. Mix to dissolve.
* If preferred, refrigerate prior to drinking.
3. Between 3-6 PM start drinking the prep.
4. Drink 1 (8oz) glass every 10-15 minutes until you finish the prep.
5. You may drink clear liquids until midnight.

Day of Procedure:

1. This prep must be completed and nothing else may be taken by mouth 4 hours prior to your procedure.
2. Please report to your appointment at the scheduled time. The procedure will last about one and one-half to two hours.
3. You MUST have a driver to drive you after the procedure due to the sedation.



Fecha:

Hora:

Lugar:

Procedimiento

Este procedimiento se efectúa para evaluar su colon (intestino grueso). Con un colonoscopio (un tubo largo y flexible) Dr. Llaneza le puede examinar el interior del colon detectando problemas como: pólipos, tumores, inflamación, divertículos, y vasos sanguíneos anormales. Si es necesario, biopsias pueden ser obtenidas durante el examen para analizarlas. Frecuentemente, pólipos pueden ser extirpados, y áreas sangrantes pueden ser cauterizadas.

Materiales

1. GoLYTELY
 2. Jugos (no del color rojo)
 3. Gelatina (no del color rojo)
 4. Café
 5. Te
 6. Caldos
 7. Refrescos
- *Nada solidó o lácteos*

Resultados y Aclaración

Para obtener los resultados del procedimiento espere 5 días laborables para llamar a la oficina (305.598.9090).

El costo de los servicios médicos del Dr. Llaneza es independiente del costo del centro donde se hace el procedimiento.

Riesgos

Complicaciones de la colonoscopia no son comunes. Los riesgos explicados por el Dr. Llaneza incluyen: reacción a los medicamentos, sangramiento, y perforación. Infórmele al Dr. Llaneza si tiene dolor o excremento negro o rojo después del procedimiento.

La preparación causa la pérdida de líquidos del cuerpo y puede resultar en deshidratación. Es importante que tome suficiente líquidos claros durante la preparación y después del procedimiento.

3 Días Antes del Procedimiento:

1. Al menos que reciba otras instrucciones no tome: Aspirina, Advil, Nuprin, Motrin, Excedrin, Plavix, Persantine, Ticlid, Aggrenox, Pletal, Coumadin, Vitamin E, Echinacea, Ginko Biloba, etc. TYLENOL es aceptable.
2. No coma nada con nueces, semillas, o frijoles.

1 Día Antes del Procedimiento:

1. Manténgase en una dieta de líquidos claros el día entero. Nada sólido, productos lácteos, o color rojo. Si es diabético, tome líquidos.
2. Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente y mezcle.
* Enfriar si desea.
3. Entre las 3-6 PM comience a tomar la solución. Tome 1 (8oz) vaso cada 10-15 minutos, hasta completar todo el recipiente.
4. Puede tomar líquidos claros hasta la medianoche.

Día del Procedimiento:

1. La preparación tiene que tomarse por completa y no tomar nada por boca, 4 horas antes del procedimiento.
2. Por favor llegar a tiempo a su procedimiento. El procedimiento demora una hora y media a dos horas.
3. Es muy importante que alguien lo acompañe para conducirlo a su casa.