

Colonoscopy Preparation

MoviPrep



MoviPrep
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)
Rx only
Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.

Date:

Time:

Place:

Procedure

This procedure is being performed to evaluate your colon (large intestine). With a colonoscope (a long flexible tube) Dr. Llaneza will be able to look at the lining of your colon through the colonoscope for abnormalities such as polyps, tumor, inflammation, diverticulosis, and abnormal blood vessels. If necessary, biopsies can be taken for analysis, polyps can be removed, and areas of bleeding can be treated. After Dr. Llaneza explains the procedure and answers your questions, you will be asked to sign a consent form.

Supplies

1. MoviPrep
 2. Juices (not the color red)
 3. Gelatin (not the color red)
 4. Coffee
 5. Tea
 6. Broth
 7. Soft Drinks
- *NO MILK PRODUCTS OR SOLIDS*

Results & Clarifications

Please call our office (305.598.9090) 5 business days after your procedure for your results.

Dr. Llaneza's service costs are separate from the facility's costs.

Risks

Complications of a colonoscopy are rare. The risks as explained by Dr. Llaneza include reactions to medications, bleeding and perforation. Be sure to inform Dr. Llaneza if you have severe pain, black or bloody stools after your colonoscopy.

A colonoscopy prep causes the body to lose a significant amount of fluid and can result in sickness due to dehydration. It is important that you drink sufficient clear liquids before and during the prep. Replenish your body by drinking clear liquids after returning home from your colonoscopy.



Colonoscopy Preparation

MoviPrep


3 Days Before Procedure:

1. Unless otherwise directed do NOT take: Aspirin, Advil, Nuprin, Motrin, Excedrin, Plavix, Persantine, Ticlid, Aggrenox, Pletal, Coumadin, Vitamin E, Herbal Medications (such as Echinacea, Ginko Biloba, etc.). **TYLENOL** is safe.
2. Do not eat any foods with seeds, beans, or nuts.




1 Day Before Procedure:

1. Follow a clear liquid diet the ENTIRE day before. NOTHING SOLID, COLOR RED OR MILK PRODUCTS. If you are a diabetic, drink regular (non-diet) liquids in moderation throughout the day.
2. Empty 1 Pouch A and 1 Pouch B into the disposable container.
3. Add lukewarm drinking water to the top line of the container. Mix to dissolve.
* If preferred, refrigerate prior to drinking.
4. At 5 PM drink the first dose. The MoviPrep container is divided by 4 marks. Every 15 minutes, drink the solution down to the next mark (approximately 8 oz), until the full liter is consumed.
5. After above step, drink 16 oz of the clear liquid of your choice. This is a necessary step to ensure adequate hydration, and an effective prep.



Day of Procedure:

1. Repeat Steps 2-3 from previous day.
2. At _____ PM/AM drink the first dose. The MoviPrep container is divided by 4 marks. Every 15 minutes, drink the solution down to the next mark (approximately 8 oz), until the full liter is consumed.
3. Drink 16 oz of the clear liquid of your choice.
4. This prep must be completed and nothing else may be taken by mouth 4 hours prior to your procedure.
5. Please report to your appointment at the scheduled time. The procedure will last about one and one-half to two hours.
6. You **MUST** have a driver to drive you after the procedure due to the sedation.



Preparación de Colonoscopia MoviPrep



MoviPrep
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)
Rx only
Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.

Fecha:

Hora:

Lugar:

Procedimiento

Este procedimiento se efectúa para evaluar su colon (intestino grueso). Con un colonoscopio (un tubo largo y flexible) Dr. Llaneza le puede examinar el interior del colon detectando problemas como: pólipos, tumores, inflamación, divertículos, y vasos sanguíneos anormales. Si es necesario, biopsias pueden ser obtenidas durante el examen para analizarlas. Frecuentemente, pólipos pueden ser extirpados, y áreas sangrantes pueden ser cauterizadas. Después de que se le haya explicado el procedimiento y contestado sus preguntas, se le pedirá que firme un permiso.

Materiales

1. MoviPrep
2. Jugos (no del color rojo)
3. Gelatina (no del color rojo)
4. Café
5. Te
6. Caldos
7. Refrescos

Nada sólido o lácteos

Resultados y Aclaración

Para obtener los resultados del procedimiento espere 5 días laborables para llamar a la oficina (305.598.9090).

El costo de los servicios médicos del Dr. Llaneza es independiente del costo del centro donde se hace el procedimiento.

Riesgos

Complicaciones de la colonoscopia no son comunes. Los riesgos explicados por el Dr. Llaneza incluyen: reacción a los medicamentos, sangramiento, y perforación. Infórmele al Dr. Llaneza si tiene dolor o excremento negro o rojo después del procedimiento.

La preparación causa la pérdida de líquidos del cuerpo y puede resultar en deshidratación. Es importante que tome suficiente líquidos claros durante la preparación y después del procedimiento.

Preparación de Colonoscopia MoviPrep

3 Días Antes del Procedimiento:

1. Al menos que reciba otras instrucciones no tome: Aspirina, Advil, Nuprin, Motrin, Excedrin, Plavix, Persantine, Ticlid, Aggrenox, Pletal, Coumadin, Vitamin E, Echinacea, Ginko Biloba, etc. TYLENOL es aceptable.
2. No coma nada con nueces, semillas o frijoles.



1 Día Antes del Procedimiento:

1. Manténgase en una dieta de líquidos claros el día entero. Nada sólido, productos lácteos, o color rojo. Si es diabético, tome líquidos regulares (no de dieta) con moderación durante el día.
2. Vacíe una bolsa A y una bolsa B en el recipiente desechable.
3. Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver.

* Enfriar si desea.

4. Al las 5 PM empiece la primera dosis. El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz.), hasta completar todo el litro.
5. Beba 16 oz. del líquido claro de su preferencia. Pare de tomar líquidos a las medianoche.



Día del Procedimiento:

1. Repita pasos 2-3 del día anterior.
2. Al las _____ PM/AM tome la segunda dosis. El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz.), hasta completar todo el litro.
3. Beba 16 oz. del líquido claro de su preferencia.
4. La preparación tiene que tomarse por completo y no tomar nada por boca, 4 horas antes del procedimiento.
5. Por favor llegar a tiempo a su procedimiento. El procedimiento demora una hora y media a dos horas.
6. Es muy importante que alguien lo acompañe para conducirlo a su casa.

