

First Aid for Dental Emergencies




Toothache

Clean the area around the sore tooth thoroughly. Rinse the mouth vigorously with warm salt water or use dental floss to dislodge trapped food or debris. DO NOT place aspirin on the gum or on the aching tooth. If face is swollen, apply a cold compress. Take acetaminophen for pain and see a dentist as soon as possible.



Cut or Bitten Tongue, Lip or Cheek

Apply ice to bruised areas. If there is bleeding apply firm but gentle pressure with a clean gauze or cloth. If bleeding does not stop after 15 minutes or it cannot be controlled by simple pressure, take the child to a hospital emergency room.



Knocked-Out Permanent Tooth


Find the tooth. Handle the tooth by the top (crown), not the root portion. You may rinse the tooth, but DO NOT clean or handle the tooth unnecessarily. Try to reinsert it in its socket. Have the child hold the tooth in place by biting on a clean gauze or cloth. If you cannot reinsert the tooth, transport the tooth in a cup containing milk. See a dentist IMMEDIATELY! Time is a critical factor in saving the tooth.

Broken Braces and Wires

If a broken appliance can be removed easily, take it out. If it cannot, cover the sharp or protruding portion with dental wax, cotton balls, gauze, or chewing gum. If a wire is stuck in the gums, cheek, or tongue, DO NOT remove it. Take the child to a dentist immediately. Loose or broken appliances which do not bother the child don't usually require emergency attention.



DENTISTRY FOR CHILDREN AT WESTON, P.A.
Yedda Gomes-Ruane, D.M.D.
WESTON TOWN CENTER MEDICAL CAMPUS
1608 TOWN CENTER BLVD., SUITE B
WESTON, FLORIDA 33326 (954) 384-4560



Broken Tooth

Rinse dirt from injured area with warm water. Place cold compresses over the face in the area of the injury. Locate and save any broken tooth fragments. Immediate dental attention is necessary.



Ayuda De Emergencia Para Problemas Dentales



DOLOR DE DIENTES

Limpie el área al rededor del sitio en donde se siente el dolor. Juegue con agua la boca varias veces con agua tibia con sal, use la seda dental entre cada diente para sacar posible comida que se haya quedado allí. Nunca ponga aspirina en las encías o en el diente que está doliendo. Si la cara se ve hinchada aplíquese una compresa con agua fría encima de la hinchazón. Tome la medicina "acetaminophen" para el dolor y visite un dentista pediatra antes que pasen 24 horas desde que comenzó el dolor.



SI LA LENGUA, LOS LABIOS, O LA MEJILLA TIENE UNA HERIDA

Aplique una compresa con hielo en el área. Si hay alguna clase de hemorragia, comprima la herida con una gaza o trapo limpio. Si la hemorragia no ha parado en quince minutos o no se puede controlar con la presión suave, lleve de inmediato al niño/a a la emergencia de un hospital o a donde su dentista pediatra.

SI SE ROMPE O DAÑAN LAS ABRAZADERAS DEL APARATO DENTAL

Si es posible que la abrazadera o parte del aparato dañado se pueda quitar fácilmente saqueos de la boca. Si es posible cubrir el metal que molesta con una bolita de algodón, chicle, o gaza hágalo mientras tiene tiempo de ir al dentista. Si el metal está molestando la encía no trate de sacarlo. Lleve inmediatamente el niño/a a ver al dentista. Piezas sueltas o dañadas que no molestan mucho no se deben de considerar como una situación de emergencia.



OTRAS CONDICIONES DE EMERGENCIA

POSIBILIDAD DE UNA QUIJADA QUEBRADA: Si se sospecha que la quijada está quebrada, trate de que no se le dé ninguna clase de movimiento, haga una amarradura con una pañueleta al rededor de la cabeza sosteniendo la quijada. Lleve de inmediato al niño/a a visitar al dentista pediatra.

HEMORRAGIA DESPUES DE QUE SE HA CAIDO UN PRIMER DIENTE O MUELA: Doble una gaza limpia en un pedazo pequeño y póngalo encima del sitio de la hemorragia. Haga que el niño muerda con poca presión este pedazo de gaza por 15 minutos. Se puede repetir este proceso una vez más. Si la hemorragia continúa, lleve a su niño a una visita donde el dentista pediatra, o a una sala de emergencia de un hospital.

AMPOLLAS O BURBUJAS EN LA PIEL O EN LA ENCIA: Muchos niños/as sufren de vez en cuando de estas condiciones. Generalmente, se consiguen pomadas en las farmacias para esta clase de problemas. Pero como muchas enfermedades pueden comenzar con una ampolla o una de estas burbujas. Es muy importante que un dentista pediatra vea al niño/a si este problema persiste.



DIENTES FLOJOS DIENTES QUE SE CAEN POR UN ACCIDENTE

Si un diente está flojo o se ha caído por un accidente tiene que visitar al dentista. Si el diente está flojo pero en su sitio ajústelo. Si el diente se ha caído, búskuelo. Si lo encuentra lévanteo cogiéndolo por la punta no por la raíz. Puede jugar el diente, pero NO lo limpie o lo moleste. Trate de volverlo a poner en su posición. Coloque una gaza limpia y haga que el niño muerda suavemente para hacer algo de presión. Si no puede volver a poner el diente en su sitio ponga el diente en un vaso lleno de agua o leche. Vaya inmediatamente a ver al dentista pediatra. Tiempo que pierde para volver a poner en su sitio es tiempo perdido.



DIENTES QUEBRADOS

Juegue el diente con agua tibia. Ponga una compresa con agua tibia en la parte de la cara que corresponde al sitio del diente quebrado. Busque la pieza que se ha partido y guárdela. Es necesario que vea al dentista inmediatamente.

